


药品名称：

【通用名称】 依帕司他片
【商品名称】 伊衡®
【英文名称】 Epalrestat Tablets
【汉语拼音】 Yi Pa Si Ta Pian

成份：

本品主要成份为：依帕司他。
化学名称为：5-[(1Z, 2E)-2-甲基-3-苯基-2-丙烯亚基]-4-氧代-2-硫代-噻唑烷乙酸。
结构式：



分子式： $C_{15}H_{13}NO_3S_2$

分子量：319.4

适应症：

糖尿病性神经病变。

规格：

50mg。

用法用量：

通常成人剂量每次50毫克(1片)，每日3次，于饭前口服。

不良反应：

- 1.过敏：偶见红斑、水泡、皮疹、瘙痒。
- 2.肝脏：偶见胆红素、GPT(ALT)、GOT(AST)、 γ -GPT(GGT)升高。
- 3.消化系统：偶见腹泻、恶心、呕吐、腹痛、食欲不振、腹部胀满感、胃部不适。
- 4.肾脏：偶见肌酐升高。
- 5.其他：极少见眩晕、头晕、颈痛、乏力、嗜睡、浮肿、肿痛、四肢痛感、麻木、脱毛。

禁忌：

未进行该项实验且无可靠参考文献。

注意事项：

- 1、本品应在医生指导下使用，药品应放置在儿童不能接触的地点，防止儿童误食。
- 2、服用本品后，尿液可能出现褐色，此为正常现象，因此有些检测项目中可能会受到影响。
- 3、过敏体质者慎用。
- 4、一旦出现过敏表现，应立即停药，并进行适当处理。
- 5、连续服用本品12周无效的患者应考虑改换其他的疗法。

孕妇及哺乳期妇女用药：

目前尚无本品用于孕妇的安全性资料，因此孕妇在需要使用本品时应当极为慎重，权衡其利弊后再决定是否使用本品。动物实验表明依帕司他可通过乳汁排泄，因此哺乳期妇女应避免使用本品。

儿童用药：

尚无儿童用药安全性的经验。

老年用药：

老年患者如有因生理机能的改变，使用本品时应考虑适当减量。

药物相互作用：

尚不明确。

药物过量：

尚无本品药物过量的报道。

贮藏：

遮光，密闭保存。

包装：

双铝包装或铝塑板包装外套铝塑复合膜袋；12片/板，12片/盒或24片/盒。

有效期：

暂定18个月(铝塑板包装外套铝塑复合膜袋)，暂定12个月（双铝包装）。

执行标准：

YBH10932005

批准文号：

国药准字H20050893

生产企业：

山东达因海洋生物制药股份有限公司